

Predavač: **Daliborka Kuzmanović**, viša med.sestra
e-mail: daliborka.kuzmanovic@sec.ba

DEPEDIKULACIJA

Vrste vašljivosti (Pediculosis):

- ▶ **Vašljivost kosmatog dijela glave
(pediculosis capitis)**


- ▶ **Vašljivost tijela (pediculosis corporis)**

- ▶ **Vašljivost pubične regije (pediculosis pubis)**

Vašljivost kosmatog dijela glave (uzročnik):

- ▶ Izazivač oboljenja je vaš- *pediculus humanis capitis*, koji parazitira na kosmatom dijelu glave
- ▶ To je siva vaš, veličine oko 3 mm, bez krila. Žanka dnevno snese 4-5 jaja (gnjide), koje se zaližepe tzv. hininom za donji dio dlake
- ▶ Iz gnjida za pet dana izlaze larve, a za tri nedjelje razvija se zrela vaš
- ▶ Odrasla vaš je hemafrodit i hrani se krvlju domaćina
- ▶ Vašljivost se prenosi direktnim kontaktom sa oboljelog čovjeka ili indirektno korišćenjem zajedničkih češljeva, marama, kapa i sl.





Vašljivost kosmatog dijela glave (klinička slika):

- ▶ **Svrab** - nakon desetak dana od infekcije nastaje svrab kao posljedica ujeda vaši
- ▶ Na koži glave mogu se zapaziti papule, urtike, kruste i znaci sekundarne infekcije piokokama
- ▶ Vratne žljezde mogu biti uvećane i jako bolne
- ▶ Dijagnoza se postavlja kliničkim nalazom vaši



Vašljivost kosmatog dijela glave (terapija):

- ▶ Šampon protiv vaški utrlja se u kosu i kožu glave i ostavi da djeluje 4-5min (po preporuci proizvođača), nakon čega se kosa dobro ispere
- ▶ Insekticidi u prahu ili tečnosti protiv vaški, pri čemu se kosa dobro naprsi ili nakvasi, te ostavi da djeluje dva sata, nakon čega se kosa dobro opere
- ▶ Terapija gnjida podrazumijeva uporno i svakodnevno češljanje gustim češljem, koji se natopi u blag rastvor sirćetne kiseline, zato što sirćetna kiselina rastapa hinin, kojim se gnjide lijepe za dlaku

Vašljivost kosmatog dijela glave (terapija):

- ▶ Terapija se obavezno ponavlja nakon sedam dana.
- ▶ Po završetku terapije, potrebno je sve temeljito očistiti, oprati, hemijski očistiti svu odjeću, a češljeve držati u toploj vodi (72°) 10-20 minuta
- ▶ Kako je pedikuloza najčešće porodično oboljenje, potrebno je sistematično i istovremeno liječiti sve članove porodice ili osobe iz radne ili životne sredine koje su oboljele, da bi se spriječili recidivi uslijed reinfekcija



Vašljivost tijela (uzročnik):

- ▶ To je bijela vaš (pediculus humanis corporis), koja živi u šavovima odjeće i rublja. Ona u šavovima polaže jaja, koja se čvrsto nalijepe na tkaninu.
- ▶ Na kožu čovjeka one prelaze isključivo radi ishrane
- ▶ Ova vaš je prenosilac rikecije (uzročnika pjegavog tifusa i rekurentne groznice)



Vašljivost tijela (klinička slika):

- ▶ Promjene su najčešće na trupu, najprije u vidu sitnih makula na mjestu uboda vaši, a kasnije se javljaju urtike i infiltrirane papule
- ▶ Bolesnici se žale na jak **svrab**, osobito noću
- ▶ Kao posljedica češanja, vide se linearne ekskorijacije
- ▶ Prisutni su znaci sekundarne infekcije piokokama

- ▶ Dijagnoza se postavlja kliničkim nalazom vaši na odjeći, posteljini, vešu.



Vašljivost tijela (terapija bolesti):

- ▶ Održavanje lične higijene i dezinfekcija tijela i odjeće
- ▶ U ove svrhe se koristi vruć vazduh (suhi sterilizator) i vodena para (autoklav). Dovoljno je tkaninu izložiti vrućem vazduhu ili vodenoj pari na 100°C . Korisno je takođe i hemijsko čišćenje
- ▶ Insekticidima se zaprašuje tkanina tokom tri nedjelje

Vašljivost pubične regije (uzročnik):

- ▶ Uzročnik bolesti je sitna, žućkasta, slabo pokretna vaš phthirus pubis. Stidne vaši žive i parazitiraju na kosmatim regijama, gdje je koža bogata apokrinim žlijezdama, te se najčešće viđaju kod pacijenata u području pubisa, perianalno, aksilarno, a rjeđe u području trepavica
- ▶ Ove vaši se rilicom pričvrste uz folikul dlake, a nogama za dlaku uz koju pričvršćuje okrugle gnjide nizane poput brojanica
- ▶ Bolest se prenosi seksualnim putem



Vašljivost pubične regije (klinička slika):

- ▶ Na izloženoj regiji bolesnici osjećaju **svrab**, koji se intenzivira noću
- ▶ Na samoj koži vide se sivo-plavičaste makule, rijetko se na koži mogu primjetiti ekskorijacije uslijed češanja
- ▶ Dijagnoza se postavlja kliničkim nalazom vaši i gnjida



Vašljivost pubične regije (terapija):

- ▶ Sprovodi se kao i kod vašljivosti kosmatog dijela glave
- ▶ Brz način liječenja podrazumijeva brijanje zahvaćenih površina kože i spaljivanje dlaka, da bi se prevenirala reinfekcija
- ▶ Kod infekcije trepavica koristi se dva puta dnevno vazelin, uz uklanjanje vaši i gnjida pincetom